

Ein Fall von retrograder Invagination nach Billroth II

In a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n
zur
Erlangung der Doktorwürde
der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität
zu Bonn.

Vorgelegt am 11. Dez. 1937

von

Ernst Bringmann

aus Bonn.

Bonn 1937

Anton Brand, Bonn.

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Prof. Dr. Freiherr von Redwitz
Korreferent: Prof. Dr. Ceelen.



*Meinen lieben Eltern
in Dankbarkeit.*

*Ein Fall von retrograder Invagination
nach Billroth II.*

Vielseitig sind die Komplikationen von Seiten des Magen-Darmabschnittes nach Gastroenterostomien und Refektionen. Das größte Interesse nehmen davon immer noch die Passagestörungen in Anspruch.

Fast zwei Jahrzehnte nach Wölflers erster Gastroenterostomie im Jahre 1881 faßte man all diese postoperativen Verdauungs- und Entleerungsstörungen als sogenannten „Circulus vitiosus“ auf. Mikulicz prägte diesen Ausdruck und glaubte die Erscheinungen würden dadurch hervorgerufen, daß der Speisebrei von der Anastomose aus nicht den Weg in den abführenden Schenkel der zur G. E. verwandten Jejunumschlinge, sondern in den zuführenden nehme und von da über das Duodenum durch den Pylorus wieder in den Magen zurückgelange. Auch der umgekehrte Weg sei möglich. Ob es diesen Vorgang in reiner Form tatsächlich gibt, ist bis heute noch nicht einwandfrei erwiesen. 1897 fand Braun zum ersten Male als Ursache dieser Beschwerden ein Ulcus pepticum, das an der abführenden Jejunumschlinge saß. Er konnte also zeigen, daß nicht immer ein „Circulus vitiosus“ im Sinne Mikulicz's beim Auftreten von Passagestörungen vorhanden sein muß.

Erst einmal auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht, mehrten sich in der Folgezeit die Mitteilungen über ähnliche und gleichartige Beobachtungen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei einer anderen Komplikation, nämlich der Invagination des Dünndarms in den operierten Magen. Es wurden schon seit $3\frac{1}{2}$ Jahrzehnten G. E. ausgeführt, als Steber 1917 als Erster über diese Komplikation berichtete. Daraufhin sind in den letzten 20 Jahren schon 37 Fälle mitgeteilt worden. Gewiß ist ihr wirkliches Vorkommen weit häufiger, da sie sich oft hinter dem klinischen Bild des hohen Ileus verbirgt. Ohne sich über den Grund der Passagestörung genau klar zu werden, spricht man dann auch heute leider noch von einem „Circulus vitiosus“. Ist eine Re-

laparotomie angezeigt, so ist man oft enttäuscht, wenn man nach Eröffnung des Abdomens keine Veränderung vorfindet. Es hat sich dann meistens um eine aufsteigende Invagination gehandelt. Der sie zum größten Teil bedingende Spasmus des Darmes, zusammen mit einer gleichzeitig einsetzenden Antiperistaltik, wurde durch Narkose und Operation gelöst, sodaß eine spontane Desinvagination eintrat. Diese intermittierenden Formen, die auch häufig nach Atropingaben zurückgehen, werden meistens nicht erkannt. Wird bei vorhandener retrograder Invagination nicht relaparotomiert, sei es wegen schlechten Allgemeinbefindens oder aus sonstigen Gründen, so kommt es zur Incarceration und Gangrän des eingestülpten Darmabschnittes und fast immer zum letalen Ausgang.

Sämtliche veröffentlichten Fälle von aufsteigender Invagination in den operierten Magen wurden nach Gastroenterostomien, sowohl antekolischen wie retrokolischen, mit und ohne Braun'scher Enteroanastomose beobachtet. Nach Magenresektionen sind bislang nur 2 Fälle von Blond bekannt, die er als Zufallsbefunde im Tierexperiment feststellte.

Es soll im folgenden über den ersten beim Menschen beobachteten Fall von retrograder Invagination nach einer Resektio Billroth II berichtet werden, der unter den klinischen Erscheinungen eines hohen Ileus auftrat und wegen schlechten Allgemeinbefindens nicht zur Relaparotomie kam. Es trat hier nach Absterben und Ausstoßung des im Magen eingeklemmten Darminvaginats eine — wohl sehr seltene — Selbstheilung ein.

K r a n k e n g e s c h i c h t e : J.-Nr. 5951/1922.

37jähriger, mittelgroßer Arbeiter, in mäßigem Kräfte- und Ernährungszustand. Familienanamnese o.B. Patient war als Kind nie ernstlich krank. Von Mai 1917 bis Februar 1919 im Krieg. 1920 Blinddarmoperation. 1922 unterzog er sich wegen Ulcus ventriculi-Beschwerden einer Diätbehandlung in hiesiger Klinik. Eine bestehende Go. wurde gleichzeitig behandelt. Da keine Besserung der Magenbeschwerden eintrat, das Erbrechen, besonders nach den Mahlzeiten immer häufiger wurde, entschloß man sich zur Laparotomie. Es wurde damals ein ca. wallnußgroßes, kallöses Ulcus am Pylorus gefunden. Nach Lösung der Verwachsungen Anlegung

einer Gastroenterostomia retrocolica posterior in der Magenmitte, da die Pylorusgegend stark verwachsen war (Dr. Clemens). Nach 14 Tagen beschwerdefrei entlassen. 1926 trat beim Holzladen ein Narbenbruch im unteren Drittel der Laparotomienarbe auf. Da Patient hierdurch nicht wesentlich behindert war, wurde von einer Operation abgesehen. Die damals ausgeführte Röntgenkontrolle ergab eine einwandfreie Entleerung durch die Gastroenteroanastomose. Nur ganz geringe Breimengen gingen durch den Pylorus. 3 Stunden p.c. Magen bis auf einen kleinen Restfleck an mutmaßlicher GE. entleert, aber kein Druckschmerz.

7. I. 1929. Wieder-Aufnahme. Patient gab an, seit Mai 1928 seien Erbrechen und Beschwerden erneut aufgetreten. Zuerst seltener dann fast täglich nach dem Essen. Erbrochenes unverdaut und oft bluthaltig. Daneben viel saueres Aufstoßen und in letzter Zeit kotartiger Geruch aus dem Munde. Unabhängig vom Essen Schmerzen im rechten Oberbauch, die nicht in den Rücken ausstrahlen. Röntgenbild ergab eine langsame, unregelmäßige Entleerung durch die Anastomose, in deren Nachbarschaft die Schleimhaut stark gewulstet war. Konstanter schmerzhafter Druckpunkt an der G.E.-Stelle. Sechs Stunden p. c. druckempfindlicher Rest im Magen und kleiner schüsselförmiger Rest im Pylorus. Wegen konstantem Druckpunkt Verdacht auf Ulcus pept. jejuni, obwohl keine Nische nachweisbar. — HCl-Deficit. Da die Beschwerden sich nicht besserten, klinisch und röntgologisch der Verdacht eines Ulcus pepticum jej. bestand, sollte der Narbenbruch operiert und dabei eine Revision der Bauchhöhle vorgenommen werden.

16. I. 1929 Operation (Prof. v. Redwitz). „Excision der alten Narbe. Bei Eröffnung des Peritoneums zeigt es sich, daß der Magen und das Netz mit der vorderen Bauchwand verwachsen sind. Ebenso bestehen starke Verklebungen des Magens mit der Gallenblase. Lösung der Verwachsungen. Am Duodenum ist deutlich das alte Geschwür, das noch nicht ausgeheilt ist, zu fühlen. Großer Magen. Die Stelle der hinteren G. E. wird freigelegt. An der Magendarmanastomose sieht man eine etwa pfennigstückgroße Rötung der Serosa. G. E. gut durchgängig. „Wegen Verdachtes auf ein Ulcus pepticum soll der Magen reseziert werden. Nach Lösung des Magens an der großen und kleinen Kurvatur wird nach sorgfältigem Abstopfen die Vereinigung zwischen Magen und Darm an der alten G.E.-Stelle gelöst. Es stellt sich dabei heraus, daß eine Perforation ins Kolon besteht (Magen-Colon-Jejunal-fistel). Das Kolon wird freipräpariert, die Öffnung durch quere zweischichtige Naht geschlossen. Darauf wird die Öffnung im

Magen provisorisch durch einige Nähte verschlossen und die Öffnung im Dünndarm durch zweischichtige Naht quer vernäht. Kolon und Dünndarm sind an den betreffenden Stellen gut durchgängig. Es folgt eine Resectio Billroth II oralis totalis antecolica mit Braun'scher Enteranastomose. Ein Ulcus pepticum wird an dem Magenrest nicht gefunden.“

Nur langsame Erholung des Patienten, da eine doppelseitige Pneumonie p. operat. auftrat, und einige Zeit später sich ein subphrenischer Abszeß hinzugesellte. Im April 1929 vorgenommene Röntgenkontrolle ergab gute Entleerung des Magens durch die Anastomose und Verwachsungen zwischen Magen und Querdarm.

Von 1929—1934 war der Patient von seiten des Magens fast völlig beschwerdefrei. Seit Mitte 1934 stellten sich wieder zeitweise Erbrechen und Druckgefühl in der Magengegend nach den Mahlzeiten ein. Mit Beginn des Druckgefühls trat jedesmal eine zunehmende Vorwölbung direkt unterhalb des Rippenbogens in der Mittellinie und links davon auf, die oft bis Kleinkindskopfgroße erreichte. Patient schildert, daß er sich von diesem Druckgefühl befreien konnte, indem er mit der Hand fest auf diese Vorwölbung drückte, die dann langsam, von einem gurgelnden, glucksenden Geräusch begleitet, verschwand. Er vergleicht den Vorgang mit dem Ausdrücken eines gefüllten Gummiballons durch eine enge Öffnung. Auch der faeculente Geruch aus dem Munde ist seitdem wieder öfters bemerkt worden.

Im August 1935 wurde Patient aufgefordert, sich zwecks erneuter Festsetzung seiner Invalidenrente im Krankenhaus zu Tr. untersuchen zu lassen. Die Untersuchung war nach seiner Angabe sehr schmerzhaft, besonders die Palpation des Leibes. Abends fuhr Patient nach Bitburg zurück. In der Nacht stellten sich starke Schmerzen im Leib ein, die von Stunde zu Stunde heftiger wurden. Gegen Morgen hatte Patient plötzlich einen solch heftigen kolikartigen Anfall, daß er glaubte, die Därme seien ihm zerrissen. Kurz darauf erbrach er Blut. Sanitätsrat Dr. Birnbach, Bitburg, als behandelnder Arzt schildert den weiteren Verlauf folgendermaßen: „Bei der Aufnahme ins Krankenhaus fand sich starke Druckschmerzhaftigkeit und Spannung im Oberbauch. Übriger Leib weich und nicht aufgetrieben. Winde gingen spontan ab. Die starken Schmerzen konnten durch Einspritzungen gelindert werden. Die Magenblutungen versuchte man durch Claudeninjektionen zum Stillstand zu bringen, was auch zum Teil gelang, denn das Erbrochene hatte seitdem nur noch geringe Blutbeimengungen. Es bestand später zur Hauptsache aus dünnflüssigem Schleim

und faecalen Massen. Stuhlgang nach Einlauf möglich. Wegen schlechten Allgemeinbefindens mußte von einem operativen Eingriff Abstand genommen werden. Die Behandlung bestand in künstlicher Ernährung mittels Klysma und intravenöser Zufuhr von Traubenzucker. Die Darreichung flüssiger Nahrung per os war zwecklos, denn nach kurzer Zeit wurde sie als stinkende Flüssigkeit wieder erbrochen. Auch ohne Nahrungsaufnahme war dauernd Brechreiz vorhanden. Patient würgte ständig. Der Zustand verschlechterte sich zusehends, sodaß täglich mit dem Ableben des Patienten, der später vollkommen somnolent war, gerechnet wurde.“

Etwa 14 Tage nach der Aufnahme ein erneuter sehr starker Brechreiz. Nach stundenlangem Würgen erbrach Patient plötzlich ein ca. 25 cm langes Stück gangränöses Dünndarms, die gefaltete Schleimhaut nach außen.

Von dem Augenblick an hörte das Erbrechen auf und die Magenpassage war wieder frei. Der Patient erholte sich sehr schnell und konnte 4 Wochen später entlassen werden. Ein faeculenter Geruch bestand aber weiter. Er lebte seitdem streng diät.

Anfang 1937. Patient kommt zur Nachuntersuchung in hiesige Klinik.

Befund: Mäßiger Kräfte- und Ernährungszustand, Kopf wieder behaart. Zunge feucht, stark belegt. Appetit mäßig. Stuhl, teils verstopft, teils breiig. Wasserlassen o. B.

Lokalbefund: Leib weich, geringe Druckschmerzhaftigkeit unterhalb des rechten Rippenbogens. Leber nicht vergrößert. Im oberen Drittel der Laparotomienarbe beim Pressen eine kleinapfelgroße Vorwölbung (Narbenbruch).

Sonstiger Körperbefund: Außer über der rechten Lunge — mäßiges Giemen und Brummen — ohne gröbere Besonderheiten. Magenfast: Nüchtern HCl-Deficit von -30 und erreichte erst 40 Minuten nach Probestück einen Wert von $+20$ freier HCl. Gesamt-Acidität stieg auf 30.

Gastroskopiebefund: (Dr. Korth) („Ansaugen von einigen Tropfen trüben, gelbgrünen kongonegativen Magenfastes. Mit dem Wolf-Schindler'schen Gastroskop wird unter Verwendung einer retrograden und einer Vorblickoptik folgender Befund erhoben): Der Magen läßt sich durch Luftblähungen nur langsam entfalten, weil die Luft offenbar z. T. in den Darm entweicht. Es wird vom Patienten kein Dehnungsschmerz dabei angegeben. Die Schleimhautfalten verstreichen auch an der Vorderwand nicht völlig, sondern bleiben als unregelmäßige, grob netzförmig angeordnete

ungleich kalibrige Wülste bestehen. Keine vermehrte Rötung der Kämme. In den Faltenältern einzelne, grauliche, blasige Schleimbeläge, kleiner trüber Schleimsee. Bei Lupenvergrößerung der Schleimhaut gewahrt man eine deutliche Vergrößerung der areolären Zeichnung. Die G.E.-Stelle kann in toto übersehen werden. Sie ist unregelmäßig oval geformt, liegt zu der großen Kurvatur und der Vorderwand zu und gewährt einen breiten Einblick in den Dünndarm. Die Dünndarmschleimhaut ist samtartig matt ohne vermehrte Rötung und zeigt sehr deutlich ihre querverlaufenden Falten. Bei längerer Betrachtung setzt eine ganz oberflächliche peristaltische Bewegung an der G.E.-Stelle ein. Die Schleimhaut des Magens und Dünndarms vereinigt sich in einem unregelmäßigen Wulst mit oft grobknotigen Verdickungen so, daß die Magenschleimhaut an einzelnen Stellen vor allen Dingen an der großen Kurvatur zur Vorderwand hin sehr stark gerafft, sich in stumpfwinklig zur Schleimhaut verlaufende, große Falten legt, die einige taschenartige Ausstülpungen abgrenzen. Auch im Bereich der G.E. keine stärkere Rötung der Schleimhaut, ebenso nicht auf den Wulstkämmen. Keine Erosionen und kein Ulcus. Auffallend ist lediglich, daß man keine, den zu- und abführenden Schenkel des Dünndarms trennende Schleimhautbrücke sieht. Das gastroskopische Bild der G.E. entspricht dem, wie man es nach einer operativ angelegten Anastomose zu sehen gewöhnt ist.“

Röntgenbefund: Starke Zählung der großen Kurvatur. Magenentleerung erfolgt sehr schnell. In der Nähe der Anastomose findet sich ein konstanter Schattenfleck, der wohl für eine Taschenbildung spricht. Verwachsungen sind sicher nachzuweisen. — Ebenso kann natürlich auch ein Ulcus pept. jej. vorliegen. Ein Anhaltspunkt für das Vorhandensein einer Magen-Jejunum-Colonfistel läßt sich röntgenologisch nicht nachweisen, ebenso wenig abnorme Verhältnisse, die eindeutig für Ausstoßung eines Invaginats sprächen.

Zweifellos haben wir hier den Fall einer aufsteigenden Invagination in den Magen nach einer $5\frac{1}{2}$ Jahre vorher angelegten Rektio Billroth II vor uns. In allen früher veröffentlichten Fällen von retrograder Einstülpung des Darmes in den operierten Magen kam es — abgesehen von den spontanen Desinvaginationen und denen, die relaparotomiert wurden — zum Exitus letalis.

Auf Grund der Anamnese und des klinischen Bildes konnte man an einen hohen Ileus denken. Auffallend war aber das starke Blutbrechen, das auf Grund früherer Mitteilungen des Schrifttums

an die Möglichkeit einer Entleerungsstörung bei blutendem Ulcus pept. jejuni denken ließ. Es nimmt daher nicht wunder, daß die wahre Ursache anfänglich nicht erkannt wurde, da das Krankheitsbild nach Magenrefektion bisher beim Menschen nicht beobachtet wurde. Bei besserem Allgemeinbefinden wäre auch hier relaparotomiert worden und man hätte die rückläufige Einstülpung in Situ beobachten können. So wurde die Diagnose erst nach Ausstoßung des Invaginats, das nach Angaben des behandelnden Arztes und des Chirurgen am Krankenhaus zu Bitburg, Dr. L e o n h a r d , zweifellos zum Jejunum gehörte, gestellt. Durch ein Mißverständnis der Pflegerin, die das Darmstück beseitigte, kam es leider nicht zur histologischen Untersuchung. Immerhin ist die Diagnose durch den genauen makroskopischen Befund eines erfahrenen Arztes sichergestellt. Ein Ulcus pept. konnte an dem oedematösen und gangränösen Invaginat bei der Betrachtung nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden.

Die Berichte über retrograde Invaginationen sind allgemein mit großem Interesse verfolgt worden. Mehrere Autoren befaßten sich eingehend mit dieser Komplikation, und so bestehen heute verschiedene Theorien über die möglichen Modifikationen, Ursprungsstellen und Ursachen.

Eine bis ins Einzelne reichende Einteilung der Formen gibt H e n f c h e n an:

1.) „Die rückläufige jejuno-jejunale Invagination der abführenden Jejunumschlinge in sich aufwärts bis zur Braun'schen Anastomose, oder bis zur G. E.-Stelle oder durch letztere in den Magen.“ (Invaginatio Jejuno-gastrica).

2.) Invagination der magenwärts vorrückenden Jejunumschlinge über die G. E.-Mündung in die abführende.

3.) Vormarschieren der einschheidenden zuführenden Schlinge durch die Braun'sche Enteroanastomose hindurch bis an die G. E.-Öffnung oder bis in den Magen hinein.

4.) Einstülpung des ganzen jejunalen Abschnittes der Anastomose, d. h. der ab- und zuführenden Schlinge samt einem dazwischen gelegenen Sporn in den Magen mit Bildung eines harten,

oedematös aufquellenden und in die Magenöffnung eingeklemmten Invaginationstumor. Diese Abart ist eine Frühinvagination, die der Operation unmittelbar — 2 bis 14 Tage — folgt.

5.) Einstülpung der abführenden Schlinge in den Magen nach der Roux'schen Y-förmigen G. E.

6.) Aufsteigende Invagination nach Magenresektion. (H e f f e).

H e r t e l ist der Meinung, daß die Invagination nur selten an der Anastomose ihren Anfang nimmt, sondern meistens an der abführenden Schlinge beginnt und die eingestülpte Dünndarmschlinge erst später durch die G.E. in den Magen vorgetrieben wird. Er kommt zu diesem Schluß, weil man bei den einzelnen Beobachtungen verschiedene Stadien gesehen hatte. Bald fand man das Invaginat 30 cm und tiefer vom Magen, bald war die eingestülpte Schlinge bis zur Gastroenteroanastomose oder gar bis in den Magen vorgedrungen. Es sei aber auch ebenso gut möglich, daß die Invagination unmittelbar an der G.E. mit einem Prolaps beginnt.

Die aufsteigende Invagination in den operierten Magen ist eine typische Spätkomplikation nach G.E., deren Auftreten zwischen 4 Monaten und 16 Jahren post operationem beobachtet wurden. — Sogenannte Frühinvaginationen — 2 bis 14 Tage post operat. — sind bisher nur viermal beobachtet worden. R e i f s c h a u e r erklärt es damit, daß bei der Relaparotomie, die ja bei den Frühfällen wegen der viel heftigeren und klareren Erscheinungen als bei den chronischen, intermittierenden Spätformen direkt vorgenommen wird, der urfächliche „Enterospasmus“ durch die Narkose gelöst wird. So bildet sich die Invagination noch vor Eröffnung des Peritoneums von selbst zurück, da bis zu diesem Zeitpunkt meist noch keine Verklebungen der Serosa vorhanden sind. Weiter führt er an, daß infolge der großen Retention von Flüssigkeitsmengen im Magen, — bis zu mehreren Litern — die eine häufige Erscheinung der akuten postoperativen Passagestörung ist, eine starke Steigerung des Mageninnendrucks entsteht, der verhindert, daß eine an der abführenden Schlinge beginnende Invagination in den Magen aufsteigen kann. Er weist auf die zwei von ihm beobachteten Fälle hin, bei denen er nur kleine, auf die abführende Jejunumschlinge beschränkte Inva-

ginationen sah. Auch in dem Fall von Delfino, der einige Tage nach der Operation ein nur 5 cm in den Magen hinaufreichendes Invaginat fand, sieht er eine Bestätigung seiner Auffassung.

Im Gegensatz dazu wurden bei allen Spätinvaginationen weit in den Magen hinaufreichende, z. T. 40—50 cm lange Einstülpungen beobachtet. Die durch das weite Vordringen der Invagination in den Magen bedingte größere Ausdehnungsmöglichkeit und oedematöse Aufquellung des Invaginats sind die Ursachen, die eine spontane Desinvagination während der Narkose verhindern. So wird, im Gegensatz zu den Frühfällen, die als Spätkomplikationen auftretende retrograde Einstülpung bei der Relaparotomie häufiger angetroffen.

Noch ein drittes Moment führt Reischauer für die relative Seltenheit der Frühinvaginationen an. Zum Zustandekommen einer Invagination ist es erforderlich, daß ein kontrahiertes Darmstück in ein nicht kontrahiertes eintritt, von letzterem überdacht, schließlich eingeschlossen und unter Vergrößerung der Einstülpung weiterbewegt wird. Er ist der Ansicht, daß es sich bei Frühfällen von postoperativen Passagestörungen gewöhnlich nicht um einen lokalen Spasmus an der abführenden Schlinge, sondern um eine tetanische Gesamtkontraktion des oberen Darmabschnittes oder des gesamten Dünndarms handelt, während bei chronischen, intermittierenden und den Spätformen wohl mehr Spasmen lokaler Art vorliegen sollen. Es sei deshalb einleuchtend, daß, wenn ein gleichmäßiger Enterospasmus des ganzen oberen Dünndarms vorliege, die Möglichkeit zur Invagination kaum bestehe.

Aus den geschilderten pathologischen Verhältnissen geht hervor, welche Erscheinungen man beim Kranken zu erwarten hat. Das *klinische Bild* der in den Magen aufsteigenden Invagination war in jedem der veröffentlichten Fälle das des hohen Darmverchlusses. Henschen meint aber, es sei noch charakteristischer, sodaß eigentlich diese schwere Operationsfolge erkannt werden könnte. Er schildert die Symptome folgendermaßen: Plötzliche „epigastrische“ Koliken und peritonitisartige Kollapsererscheinungen, wobei — mit Ausnahme der epigastrischen Zone — der Leib weich und eingesunken ist. Ebenso ist nur der Oberbauch druckempfindlich und zeigt reflek-

torische Abwehrspannung. Auftreten von dauernden Zwangserbrechen, zunächst rein gallig, später mit immer mehr oder weniger Beimengungen. Kotbestandteile im Erbrochenen sind seltener. In mehr als der Hälfte der beobachteten Fälle konnte ein wurstförmiger, über faustgroßer, quer oder vertikal verlaufender Invaginationstumor, der respirationsverschieblich war, getastet werden. Fehlen die Plätschergeräusche im Darm, so ist oft ein „Magengurgeln“ bei vermehrter Peristaltik nachzuweisen. Stuhl- und Windverhalten sind selten.

Außerdem beschreiben *Henfchen, v. Brunn, Fiorentini* ein für die in den Magen aufgestiegene Invagination typisches Röntgenbild: Abflachung oder paradoxe, nach oben konvexe Umformung der großen Kurvatur, durch Einbuchtung des Darmes in das Magenlumen hervorgerufen; flächenhafte Aufhellung des Magenschattens mit fehlender Entleerung des Röntgenbreies aus dem Magen und Unsichtbarkeit des Gastroenterostomieauslaufes. Verziehung oder Verdrängung des präpylorischen Teiles nach rechts.

Lenarduzzi und *Bonomini* hatten Gelegenheit, bei 2 Fällen — 25- und 30-jährigen Männern — eine intermittierende jejuno-gastrische Invagination nach G.E. eingehend röntgologisch zu beobachten. Sie fanden als direkten Nachweis der intermittierenden Form den schon erwähnten Füllungsdefekt des Magens, der verschiedene Form und Ausdehnung annahm und zeitweise verschwand. Als indirektes Symptom die Atonie und Ekstasie des Magens, die aufgehobene oder stark verminderte Passage des Breies durch die Anastomose und die Wiederherstellung des Breidurchganges nach Rückgang der Invagination. Verf. kommen zu dem Schluß, daß es möglich ist, solche intermittierenden Invaginationen röntgologisch nachzuweisen. Sie sind der Ansicht, daß solche vorübergehende Formen viel häufiger vorkommen, als angenommen wird und zum großen Teil Ursache der Passagestörungen nach G.E. sein dürften.

Baumann berichtet über einen Fall, bei dem 11 Jahre nach Anlegung einer Gastroenterostomia antecolica anterior mit Braunschwer E.A. eine jejuno-jejunale Einstülpung operativ desinvaginiert wurde. Die Invagination trat 9 Wochen später abermals auf und

drang diesmal bis in den Magen vor. Reischauer schildert das charakteristische Bild einer intermittierenden Invagination, die unter der Diagnose: „Hindernis in der abführenden Schlinge“, zur Relaparotomie kam und dabei in Situ beobachtet werden konnte. Der außergewöhnliche Operationsbefund Reischauers soll hier wiedergegeben werden:

„Magen sehr groß, Wand hypertrophisch, Ulcus an der kleinen Kurvatur präpylorisch, G.E. breit offen, beide Schlingen weit, kein Ulcus pept. jejun. Wandhypertrophie sowohl der zu- wie abführenden Schlinge. Letztere ist im oberen Teil unverkennbar erweitert, wird nach abwärts immer enger und geht ohne scharfe Grenze etwa 20 cm unterhalb des Magens in auffallend eng kontrahierten, runzlich, matt und blaß aussehenden Dünndarm über. Diese Kontraktion betrifft den gesamten übrigen Dünndarm. Nach kurzen Augenblicken setzen ohne Berührung des Darmes, an der abführenden auffallender als an der zuführenden Schlinge, träge aber tiefgreifende peristaltische Kontraktionen ein. Diese sind ganz unkoordiniert und mehrfach ist zu erkennen, wie ein kontrahierter Darmteil in einen nicht kontrahierten etwas hineinkriecht und schirmförmig überdacht wird.“

Aus dem Vorhergehenden ist zu ersehen, daß sicherlich mehrere Phasen bzw. Modifikationen dieser postoperativen Komplikationen möglich sind und daß dementsprechend das Symptomenbild ebenfalls wechselnd sein muß.

Die Dünndarminvagination in den operierten Magen ist zwar ein seltenes, aber doch sehr schwerwiegendes Ereignis, das eine Aufklärung seiner *Ursachen* fordert. Es hat hier seit langem nicht an Untersuchern gemangelt, die eine Reihe von auslösenden Momenten fanden und bald dieses bald jenes als eigentliche Ursache ansahen. In Wahrheit liegen die Verhältnisse wohl meist komplizierter, und zwar so, daß mehrere Gegebenheiten bei dem Zustandekommen einer Einstülpung konditional zusammenwirken. Oft kann aber eine von ihnen als die obligate Bedingung erkannt werden.

Eine Übersicht über die bis jetzt veröffentlichten Fälle von retrograder Invagination in den operierten Magen, die beim Menschen bisher ausschließlich nach Gastroenterostomien beobachtet wurden, ergibt, daß die gewählte Operationsmethode keinen Einfluß auf ihr

Zustandekommen hat. Nach Hertel's Feststellungen sind bei den bekanntgewordenen Fällen hintere und vordere G.E. fast gleichmäßig beteiligt gewesen. Auch die Braunsche Enteroanastomose bietet keinen Vorteil. Das Invaginat kann diese verstopfen oder durch sie hindurch bis in den Magen aufsteigen. (Kopp). Demgegenüber bietet die Refektion hinsichtlich dieser Komplikation — wie überhaupt aller postoperativen Passagestörungen — einen großen Vorteil.

Rein mechanisch sind die Ursachen, die Hartert auf Grund einer eigenen Beobachtung annimmt. Bei seinem Patienten trat im Anschluß an einen Diätfehler — 11½ Jahre nach der G.E. — plötzlich Erbrechen auf, und kurz darauf stellten sich die Symptome eines hohen Ileus ein. Bei der Relaparotomie fand er dann eine retrograde Invagination. Hieraus zog er den Schluß, daß wohl eine Saugwirkung des Magens, durch Erbrechen — Öffnung der Kardia — bedingt, die rückläufige Einstülpung der abführenden Jejunumschlinge hervorruft, besonders dann, wenn eine breite Anastomose vorliege. Unterstützend wirke dabei der erhöhte Bauchinnendruck.

Dieser Auffassung schließt sich Baumann im wesentlichen an, macht aber daneben eine gleichzeitig einsetzende Antiperistaltik des oberen Dünndarms mit verantwortlich. Andere, wie Amberger schuldigen Zugwirkungen, hervorgerufen durch Schrumpfungsprozesse des Mesenteriums dieser Schlinge, an. Henschen bringt übermäßige Größe der Gastroenterostomieöffnung mit ungenügender Heranbildung einer sphinkterartigen, muskulären Ersatzschleife durch die Magenmuskulatur ursächlich in Zusammenhang, etwa so, wie in dem von Bevan veröffentlichten Fall, bei dem eine 9 Zoll breite Anastomose gefunden wurde.

Ob all diese mehr mechanischen Momente wirklich allein eine Einstülpung des Anastomosendarmes bewerkstelligen können, stellt Hertel mit Recht als fraglich hin. Sicher sind diese Erklärungsversuche nicht für alle Fälle ausreichend. Sie sind einander ergänzend, aber keiner von ihnen ist erschöpfend. Daher versuchte Fiorentino im Tierexperiment eine durch die Anastomose in den Magen aufsteigende Einstülpung der Jejunumschlinge zu erreichen, um durch die dabei gemachten Beobachtungen dem Problem näher

zu rücken. Er verwandte dazu steigende Apomorphindosen. Die Versuche jedoch blieben erfolglos.

Blond, Reichauer u. a. schuldigen spastische Zustände des Magendarmtraktes an. Auf Grund seiner Untersuchungen kommt Blond zu dem Schluß, daß es sich bei den als „Circulus vitiosus“ bezeichneten, nach G.E. auftretenden funktionellen Störungen, handelt: entweder um eine intermittierende spastische Incarceration der zur G.E. verwandten Jejunumschlinge in einen „Sanduhrspasmus“ des Magens oder um eine intermittierende aufsteigende Invagination des Jejunums in die G.E.-Lichtung und schließlich um einen zirkulären Spasmus der abführenden Schlinge. Er ist der Ansicht, daß die spastische Einklemmung, die intermittierende retrograde Einscheidung in den Magen und als letztes das Ulcus pepticum jejuni nur verschiedene Stadien ein und derselben Funktionsstörung sind. Dieser Meinung schließt sich Reichauer an und fügt hinzu, daß sich das Ulcus pepticum jejuni und die chronische intermittierende Invagination auch klinisch nicht unterscheiden.

Schiebt sich aber, durch stärker einsetzende Antiperistaltik und andere Faktoren bedingt, die Invagination weiter in den Magen vor, so ist, bei gleichzeitig auftretendem und abklemmendem Spasmus der G.E.-Stelle eine spontane Desinvagination nicht mehr möglich. Man hat dann unter dem klinischen Bild eines hohen Ileus die ausgebildete Invagination in den Magen vor sich.

Trotzdem man bei den zum größten Teil untersuchten Invaginatoren nie ein Geschwür hat nachweisen können, ist Kopp der Ansicht, daß wohl nur ein Ulcus pept. als Ursache dieser Komplikation in Frage komme. Kopp und Blond schuldigen das Geschwür für die Entstehung einer Antiperistaltik und damit der Grundbedingung der aufsteigenden Invagination an. Henrichen glaubt, eine gewisse Invaginationsbereitschaft sei wohl nach jeder Gastroenterostomie vorhanden und werde zum großen Teil durch die Selbstbefreiungsversuche des Jejunums gegenüber der Anastomose, zum anderen Teil durch segmentäre Spasmen und allzu schnelle Entleerung des Magensaftes in den Darm hervorgerufen. Dieser „Invaginationsbereitschaft“ stellt sich nach Henrichen die motorische Kraft des Magens,

das starke Druckgefälle und die „schleufendruckartige“ Wirkung des Mageninhaltes entgegen, zusammen mit den die G.E.-Schlinge verankernden Verwachsungen und mit einer die Beweglichkeit herabsetzenden fibrinösen Entzündung des Jejunumsgekröses. Ist die Wirkung dieser Schutzmaßnahmen aufgehoben, so können, als Produkt regelwidriger Antiperistaltik, aufsteigende Selbsteinstülpungen auftreten, die, im Jejunum beginnend, bis zur G.E. fortschreiten. Ist die retrograde Invagination erst einmal im Gange, so wird das zum Zweck der Ausstoßung des „Fremdkörpers“ einsetzende Erbrechen die Einstülpung nur noch tiefer in den Magen hineintreiben. (H e n f c h e n).

Wie schon oben erwähnt, ist es zweifellos so, daß mehrere nebeneinander bestehende Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um dieses Zustandsbild hervorzurufen. Es ist schlecht denkbar, daß z. B. Saugwirkung des Magens oder erhöhter Bauchinnendruck die alleinige Ursache der aufsteigenden Invagination abgeben, wenn nicht auch gleichzeitig eine Antiperistaltik hinzukommt. Erhöhter Bauchinnendruck und Saugwirkung sind bei jedem Erbrechen vorhanden, trotzdem kommt es so selten zur Einscheidung, weil eben die rückläufige Peristaltik im oberen Dünndarm normalerweise fehlt.

Daß die Größe der Anastomosenöffnung eine Rolle spielt, ist einleuchtend, sei sie nun primär groß angelegt oder sekundär durch intermittierende aufsteigende Invaginationen ausgeweitet. Zweifellos hat aber die von B l o n d und R e i f s c h a u e r vertretene Theorie der spastischen Komponente als Ursache dieser Komplikationen die größte Wahrscheinlichkeit für sich. B l o n d möchte eine nervöse Prädisposition voraussetzen, weil er bei Psychopathen, Neurasthenikern und Vagotonikern am häufigsten postoperative Störungen beobachtet hat.

Durch die Wegnahme des am meisten zu Spasmen neigenden Magensegments bei der Resektio Bi II glaubte man die Gefahr des Ulcus pept. jejun. und der aufsteigenden Invagination vollkommen beseitigt zu haben. Es wurde aber schon frühzeitig darauf hingewiesen, daß eine gewisse Möglichkeit noch immer besteht, und zwar dann, wenn lokale Spasmen der Jejunumschlinge auftreten, die

eine Ernährungsstörung und damit die Grundlage eines Ulcus pept. jejun. im Gefolge haben können. Allerdings ist diese Möglichkeit durch die veränderten Magen Säurewerte gering. Tatsächlich sind verhältnismäßig wenige Ulcera pept. jej. nach Resektionen bekannt geworden.

Im Tierexperiment konnte B l o n d 1928 beweisen, daß auch eine retrograde Invagination in den resezierten Magen möglich ist. Zwei Hunde, bei denen er als Voroperation für andere Experimente eine Resectio Bi II mit terminolateraler Anastomose ausgeführt hatte, gingen kurz nach der Operation unter dem klinischen Bild des „Circulus vitiosus“ zu Grunde. Wie B l o n d mitteilt, handelt es sich in beiden Fällen um Zufallsbefunde, da er nicht die Absicht hatte, Invaginationen hervorzurufen. Wegen ihrer Seltenheit seien die beiden Befunde B l o n d s mitgeteilt.

1. Fall. „Brauner Wolfshundbastard. Operation: Mediane Laparotomie, Durchtrennung des Treitz'schen Bandes, Resektion des Duodenums, blinder Verschuß des Duodenums und Jejunums. Resektion des isthmischen Anteils des Magens über die präpylorische Furche hinaus, Endolaterale Anastomose des Magenstumpfes in das obere blinde Ende des Jejunums, dreischichtig. Laterale Anastomose zwischen dem abführenden Schenkel des Jejunums und dem blinden Duodenalstumpf, dreischichtig. Verschuß der Bauchdecken in 4 Schichten.“

Obduktionsbefund: „Resektion des ganzen Duodenums bis auf ein 5 cm langes, blind verschlossenes Stück, in welches der Ductus Wisungianus mündet. Dieser blinde Sack ist mit einer oberen Jejunalschlinge anastomosiert. Die Anastomosenöffnung ist für zwei Finger durchgängig. Im Lumen dieser Jejunalschlinge deutlich Galle nachweisbar. Der ganze Darm maximal kontrahiert. Resektion des isthmischen Anteils des Magens und terminolaterale Anastomose des Magens mit der obersten, blind verschlossenen Jejunalschlinge. Bei Eröffnung des Abdomens fällt vor allem der mächtig geblähte Magenfundus auf, welcher das linke Zwerchfell nach oben drängt. Die Blähung ist, wie sich nach Eröffnung des Magens herausstellt, nur durch Gas bedingt. In diesem geblähten Magen ist die anastomosierte Jejunalschlinge tief invaginiert. Der sich vorwölbende Teil des Magens umschließt kranzartig den abführenden Jejunalschenkel. Das blind verschlossene Ende ist jedoch vollkommen handschuhfingerartig in das Magen-

innere ein- und umgestülpt. Der abführende Schenkel ist 2—3 cm in das Innere invaginiert und das Lumen vollkommen spastisch kontrahiert. Nähte überall suffizient, das Peritoneum überall glatt und glänzend. Maximale Dilatation des rechten Herzventrikels. Keine Pneumonie.

2. Fall. „Schwarzer Rattler. Weibchen. Operation: Laparotomie etwa 0,5 cm rechts von der Medianlinie. Durchtrennung des Treitz'schen Bandes, Mobilisierung der obersten Jejunalschlinge; Refektion des antralen Anteils des Magens mit terminolateraler Anastomose zwischen Magentumpf und Jejunum, nach vorherigem Verschluss des blinden Endes des Duodenums. Verschluss der Bauchwand in 4 Etagen.“

Obduktionsbefund: Peritoneum glatt und glänzend. Beim Eröffnen sind die Därme leer und kontrahiert. Der Magen zeigt an der Anastomosenstelle, die vollständig rein, eine aufsteigende Invagination der beiden Schenkel des Jejunums in das Mageninnere; die beiden Schenkel doppelflintenrohrartig nebeneinander, die Übergangsstelle zeigt einen starken Sporn, der über 1 cm in das Cavum des Magens hineinreicht.“

Wenn wir die bisherigen Vorstellungen und Erfahrungen auf unseren Kranken anwenden, so ist folgendes zu sagen: Es wurde auch hier ein Resectio Billroth II antecolica mit endolateraler Anastomose zwischen Magentumpf und Darm vorgenommen. Dazu Braunsche Enteroanastomose. Eine Röntgenkontrolle nach 3 Monaten ergab einwandfreie Entleerung des Magens durch die Anastomose. 5½ Jahre war der Patient beschwerdefrei. Er konnte damals fast alle Speisen — außer Eiern — vertragen. Ohne irgendwelche ihm bekannten äußeren Ursachen traten dann nach diesem beschwerdefreien Intervall zeitweise Erbrechen und Druckgefühl in der Magenregion nach den Mahlzeiten auf. Hier haben wir zweifellos die Zeichen zeitweiser Entleerungsstörungen durch die Anastomose vor uns. Dies wird noch deutlicher durch die Angaben des Patienten, daß er durch starken Druck auf den vorgewölbten Magen in der Lage war, die Entleerung herbeizuführen. Erklären läßt sich dieses so, daß das an der Anastomose aufgetretene Hindernis durch den erhöhten Mageninnendruck überwunden wurde. Ob es sich dabei um intermittierende, aufsteigende Invaginationen der Anastomosenschlinge oder mehr um

lokale Spasmen des abführenden Schenkels gehandelt hat, ist retrospektiv schwer zu entscheiden.

Ein Jahr später trat dann im Anschluß an eine für den Patienten schmerzhaft und sicherlich aufregende Untersuchung — man wollte ihm die Rente ganz entziehen — ein mit Schmerzen im Leib beginnender akuter Darmverschluß auf. Nachdem das Erbrochene zuerst die genossenen Speisen — Schleimsuppe und Weißbrot — enthielt, wurde es später stark blut- und kothaltig. Der vom Patienten angegebene plötzlich aufgetretene kolikartige Schmerz ist mit Wahrscheinlichkeit auf die Einklemmung der invaginierten Darmschlinge an der Anastomose zurückzuführen. Die daraufhin einsetzende Stauung und oedematöse Aufquellung des Invaginats wird eine spontane Desinvagination unmöglich gemacht haben. Auch der Spasmus an der Anastomose konnte durch das dauernde Erbrechen nicht zur Lösung kommen, sodaß die Ernährungsstörung des Invaginats fortschritt. Daß der Patient trotzdem am Leben blieb, ist wohl nicht zuletzt der dauernden künstlichen Ernährung, sowohl intravenös als auch rektal, zu verdanken. Betrachtet man im Vergleich dazu die veröffentlichten Fälle von aufsteigender Invagination, bei denen keine Relaparotomie vorgenommen wurde, so kamen sie alle innerhalb weniger Tage zum Exitus — soweit es sich nicht um eine intermittierende Form handelte. — Es ist wohl als sicher anzunehmen, daß in diesem Fall die toxisch wirkenden Abbauprodukte des langsam absterbenden Invaginats nicht in die Blutbahn gekommen sind. Der Patient hätte bei dem schlechten Allgemeinzustand diese Intoxikation zweifellos nicht überstanden.

Eine große Seltenheit ist auch die in unserem Fall eingetretene Selbstheilung durch Ausstoßung des abgestorbenen Invaginats mit anschließender unge störter Passage der Speisen.

Garré-Naegeli sind bei Besprechung der unteren Dünndarminvagination und ihrer Selbstheilung der Ansicht: „Ist die Ob-
turation keine komplette“ — Verff. meinen in diesem Fall die Durchgängigkeit des Darmes, sodaß die Gasblähung der Invagination ausbleibt und eine Peritonitis nicht entsteht — „und geht die Nekrotisierung des Invaginats langsam vor sich, so können sich am

Invaginatshals Verklebungen und Verwachsungen bilden, sodaß nach völliger Gangrän und Abstoßung des Invaginats in das Darmlumen die Kontinuität wieder hergestellt ist. Es sind dies Spontanheilungen, wie sie gelegentlich beobachtet wurden.“

Diese Erklärung der Selbstheilung von Garré-Naegeli ist für den beschriebenen Fall am passendsten. Auch hier kam, trotz wahrscheinlich vollständigem Verschuß der Anastomose, die Gefahr der Peritonitis deshalb weniger in Frage, weil die Obturation sehr hoch saß und sich infolgedessen keine Gasblähung darüber entwickeln und den erkrankten Darm unter Spannung setzen konnte. Daß das Hindernis im oberen Darmabschnitt gelegen war, bewies der spontane Abgang von Winden und der nach Einlauf entleerte Stuhl. So haben wir hier, wie die jetzige gute Nahrungspassage zeigt, eine Selbstheilung nach eingeklemmter, in den Magen aufgestiegener Invagination im Anschluß an eine Magenrefektion vor uns.

Die Bedeutung solcher retrograder Invaginationen auch nach anderen Magenoperationen darf trotz ihrer Seltenheit nicht unterschätzt werden, denn wie schon ausgeführt wurde, ist die intermittierende Form häufiger als man gewöhnlich annimmt. Durch Zusammentreffen verschiedener unglücklicher Zufälle kann, wie in unserem Fall, ein akuter, vollständiger Darmverschuß entstehen, der sich spontan nicht mehr zurückbildet. Man sollte beim *Auftreten* von Passagestörungen nach vorangegangener Magenoperation, sei es nun eine G.E. oder eine Refektion, nie die Möglichkeit dieser Komplikation außer Acht lassen. Gehen die Erscheinungen auf Spasmolytica nicht zurück, so soll man sich frühzeitig zur Relaparotomie entschließen, bevor der Allgemeinzustand zu schlecht wird, und der invaginierte Darm seine Erholungsfähigkeit verloren hat. In keinem Fall darf man mit der seltenen Selbstheilung rechnen und eine abwartende Haltung einnehmen.

Daß eine operative Desinvagination bzw. eine Refektion des nicht erholungsfähigen Invaginats von Dauererfolg sein wird, ist nicht glaubhaft, wenn nicht die ursächlichen Momente ausgeschaltet sind. Schloessmann empfiehlt, nach Desinvagination die einge-

stülpte ab- und zuführende Darmschlinge an den Querdarm zu fixieren.

Prophylaktische Maßnahmen in Form verbesserter Operationstechnik stehen nicht zu Gebote, da das Krankheitsbild keine einheitliche mechanische Ursache hat.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. v. Redwitz für die Überlassung des Themas, sowie den Herren Saintätsrat Dr. *Birnbach*, *Bitburg* und Dr. *Korth* für ihre freundliche Unterstützung zu danken.

Literatur-Verzeichnis.

- Amberger: Dünndarminvagination in den abführenden Schenkel einer vorderen Gastroenterostomie.
Zentralbl. f. Chirurg. 48 (1921) S. 1541.
- Arnsberger: Retrograde Dünndarminvagination nach Gastroenterostomie.
Zentralbl. f. Chirurg. 49 (1932) S. 190.
- Baumann: Aufsteigende Jejunuminvagination nach Gastroenterostomie
Zentralbl. f. Chirurg. 48 (1921) S. 1543.
— Wiederholte aufsteigende Dünndarminvagination bei einer gastroenterostomierten Frau.
Archiv f. clin. Chirurg. 111 (1919) S. 504.
- Blond: Experimenteller Beitrag zur aufsteigenden Invagination.
Archiv f. klin. Chirurg. 153 (1928) S. 53.
— Die Beziehungen des sogen. Circulus vitiosus nach Gastroenterostomie zum Ulcus pept. jejuni postoperativ. Ein Beitrag zur spasmodischen Ulcusgenese.
Archiv f. klin. Chirurg. 135 (1925) S. 281.
- v. Brunn: Über den Invaginationsileus nach Gastroenterostomie.
Brun's Beiträge für klin. Chirurg. 132 (1924) S. 106.
- Delfino: Eine seltene Komplikation der Gastroenterostomie.
Dtsch. Zeitschr. f. Chirurg. 174 (1922).
- Garré-Naegeli: Handbuch der prakt. Chirurgie.
(Garré-Küttner-Lexer) 3. Bd. S. 560.
- Hartert: Dünndarminvagination nach Gastroenterostomie.
Zentralbl. f. Chirurg. 48 (1921) S. 1054.
- Henfchen: Über die Invagination im Bereich des Magens.
Archiv f. klin. Chirurg. 148 (1927) S. 730.
- Hertel: Die Gastroenterostomie und ihre Fehlerquellen.
Brun's Beiträge 142 (1928) S. 157.
- Hesse: Fehler, Gefahren und unvorhergesehene Komplikationen in der Chirurgie des Magens.
Erg. d. Chirurg. Bd. 25 (1932).
- Himmelman: Innere Einklemmungen nach Magenoperationen.
Chirurg. 23 (1933) S. 907.
- Kopp: Retrograde Invagination nach Gastroenterostomie.
Niederländsch. Didschr. v. geneesk. 69 (1925), S. 1709.
- Lenarduzzi-Bonomini: Das röntgologische Bild der postoperativen jejuno-gastrischen Invagination.
Archiv ital. Mal. Appar. dig. 1 (1932) S. 457.

Reifchauer: Zur Frage der postoperativen Paßlagestörung des Magens.
Eine Kritik der heutigen Anschauungen über das Wesen der
akuten Magenatonie und anderer typischer Komplikationen nach
Bauchoperationen.

Brun's Beiträge 144 (1928) S. 639; 145 (1929) S. 101, 229, 397.

Schloßmann: Rückläufige Dünndarminvagination in den Magen
nach Gastroenterostomie.

Zentralbl. f. Chirurg. 48 (1921) S. 105.

Lebenslauf.

Ich, Ernst Bringmann, wurde als Sohn des Hauptlehrers Rudolf
Bringmann und seiner Ehefrau Anna, geb. Schwanstecher, am 21. 8.
1912 zu Effelder (Eichsfeld) geboren, woselbst ich auch die Volks-
schule besuchte. 1931 bestand ich am Gymnasium zu Heiligenstadt
die Reifeprüfung. Seit S.S. 1932 studiere ich an der Universität Bonn
und legte im Herbst 1934 die ärztliche Vorprüfung ab und am 29.
11. 1937 das ärztliche Staatsexamen.
